


L'ORTODONZIA INTERCETTIVA FUNZIONALE



DEFINIZIONE

DI MALOCCLUSIONE:

- malocclusione vuol dire "morso sbagliato".

Capire il motivo per cui si manifesta, e le conseguenze che ne derivano, significa comprendere di doverla curare già nella prima infanzia e non a permuta dentale avvenuta (cioè attorno ai 10-12 anni) (vedi prevenzione)

CAUSE DI MALOCCLUSIONE:

- **GENETICHE:** se i genitori o parenti stretti sono portatori della stessa malocclusione
- **FUNZIONALI:**
 - se il bimbo respira con la bocca e non con il naso
 - suzione prolungata del succhiotto, dito, labbro, corpi estranei
 - deglutizione atipica " infantile"



- **ESTRAZIONI PRECOCI DEI DENTI DA LATTE:**
i denti permanenti erompono seguendo il canale eruttivo dei denti da latte. Se quest'ultimi vengono estratti precocemente, si corre il rischio di ridurre il perimetro dell'arcata con conseguente mal posizione dei denti

COME RICONOSCERE UNA MALOCCLUSIONE:

- Se i denti sono accavallati: affollamento
- Se il bambino tiene abitualmente la bocca aperta perché non riesce, o con difficoltà, ad avvicinare le labbra tra loro: morso aperto i denti anteriori non combaciano



- Se il vostro bambino quando sorride scopre troppo la gengiva: sorriso gengivale: il piano occlusale non è corretto



- Se il vostro bambino ha denti superiori troppo sporgenti (a causa del succhiamento del ciuccio, dito ecc) se il labbro inferiore è arretrato, se parlando/deglutendo la lingua è in mezzo ai denti o il mento è contratto: **morsò in avanti**



- Se quando il vostro bambino sorride a denti stretti e non riuscite a vedere i suoi denti inferiori:

morsò coperto



- Se quando il vostro bambino sorride gli incisivi inferiori sporgono più in avanti degli incisivi superiori, se visto di profilo il mento è troppo sporgente/ in avanti: **morsò inverso**



COME CURARE QUESTE **MALOCCLUSIONI:**

Se il bambino viene intercettato in età precoce 4-5-6 anni la terapia ortodontica elettiva è chiamata

Intercettiva mio Funzionale



PRIMA

CON DISPOSITIVO
FUNZIONALE

DOPO

Con dispositivi semplici, in tempi brevi, con più confort delle terapie fisse per i piccoli pazienti, si risolvono le malocclusioni, migliorano le disfunzioni quale : respiratoria , deglutitoria , fonatoria, si riequilibra l'assetto posturale.

SI RIEDUCA LA FUNZIONE PER
MODIFICARE LA FORMA